

SEGURIDAD

No se conocen efectos nocivos del uso diagnóstico de la RM.

La RM utiliza un campo magnético muy potente que atrae los objetos metálicos ferromagnéticos y puede moverlos. El campo magnético está siempre activo y no se puede entrar en la sala de RM con objetos metálicos o magnéticos.

Si usted tiene puesto cualquiera de los dispositivos que se citan abajo notifíquese al médico que ha solicitado la RM.

CUESTIONARIO DE SEGURIDAD

• Preguntas generales

- ¿Se ha hecho alguna RM anteriormente?
- ¿Padece alguna enfermedad: diabetes, insuficiencia renal, asma, alergias, glaucoma?
- ¿Está tomando algún medicamento?
- ¿Tiene alergia a algún medicamento?
- ¿Tiene alergia a algún alimento?
- ¿Le han inyectado algún contraste radiológico?
- ¿Está o puede estar embarazada?
- ¿Fecha de la última regla?
- ¿Está en periodo de lactancia materna?

• **DISPOSITIVOS QUE CONTRAINDICAN LA RM**

Si le han puesto alguno de estos dispositivos -en principio- no puede entrar en la sala de RM.

- Marcapasos (*)
- Desfibrilador
- Suturas metálicas (clips) de aneurismas u otras lesiones cerebrales
- Neuroestimulador
- Bioestimulador
- Implante en oído (implante coclear, etc...)
- Bombas de perfusión
- Expansor de mama

(*) Algunos marcapasos son RM-compatibles. Los radiólogos decidirán si es posible hacer la RM y si está indicada su realización en cada paciente en particular. Si es factible y está indicada se hará en coordinación con la electrofisiología para revisión del marcapasos antes y después de la RM.

CUESTIONARIO DE SEGURIDAD

• **DISPOSITIVOS QUE PUEDEN SER CONTRAINDICACIÓN RELATIVA O CONDICIONAR LA FORMA DE HACER LA RM**

Las personas portadora de estos dispositivos serán evaluadas de forma individualizada. En caso de duda, el radiólogo valorará si es posible hacer la RM.

- ¿Algún objeto metálico (balín, alfiler...)? ¿Dónde?
- ¿Cuerpo extraño metálico en los ojos?
- ¿Ha trabajado con soldaduras?
- ¿Lleva algún catéter para medicación?
- ¿Tiene suturas metálicas o grapas quirúrgicas?
- ¿Tiene algún dispositivo intravascular, "stent" etc....)
- ¿Prótesis ortopédica (cadera, rodilla, et.)
- ¿Dispositivo de fijación de la columna?
- ¿Prótesis de mama?
- ¿Implante o prótesis de pene?
- ¿Malla quirúrgica?
- ¿D.I.U., diafragma, dispositivos hormonales...?

• **OBJETOS QUE NO PUEDEN ENTRAR EN RM**

Debe dejarlos en la cabina o a un acompañante.

- Audífonos
- Prótesis dentales retirables
- Pelucas
- Lentillas de color
- Piercing (si es posible retirarlo)
- Hebillas, horquillas, sujetadores del pelo
- Pendientes, reloj, cualquier joya
- Llaves, mecheros, monederos, monedas, bolígrafos
- Tarjetas de crédito o magnéticas, Móvil
- Navajas, tijeras, etc...

Resonancia Magnética de Cuerpo

<http://www.rm cuerpo.net>

INFORMACIÓN A PACIENTES

RM DEL ANTEBRAZO

Servicio de Radiología



SERVIZO
GALEGO
de SAÚDE

Complejo Hospitalario Universitario
A Coruña

1. Qué es la resonancia magnética (RM)

Es una técnica de imagen para el diagnóstico que permite obtener imágenes del cuerpo y analizar sus características. Proporciona información distinta a la de las radiografías, ecografía o tomografía computarizada.

Se realiza en una máquina que es un cilindro abierto por los dos extremos y una camilla que se desplaza para colocar la parte del cuerpo que se va a estudiar en el centro.

2. Para qué se realiza la RM

La RM se utiliza para conocer las características del antebrazo.

3. Preparación

No necesita ninguna preparación.

4. Qué ocurre al llegar a RM

Personal de enfermería o técnicos de la unidad le recibirá y le acompañará a una cabina.

Le harán preguntas (**Cuestionario de seguridad***) para asegurarse que se le puede hacer la RM y que no hay ninguna contraindicación.

Si hubiera alguna contraindicación, se le explicará que no es posible hacer la resonancia y el motivo.

5. Qué hay que hacer durante la exploración

Debe permanecer sin moverse para que las imágenes sean adecuadas.

6. Qué ocurre dentro de la sala de RM

Le indicarán que se acueste sobre la camilla de la RM.

Le colocarán unos aparatos sobre el antebrazo imprescindibles para obtener las imágenes.

Se le proporcionará un timbre para que pueda llamar, si lo necesita.

Después se desplazará la mesa hasta la posición óptima en la máquina.

La exploración dura en torno a 30 minutos.

No notará ninguna molestia.

Durante la obtención de las imágenes escuchará un ruido intenso que es normal.

Todo el tiempo el personal de resonancia (radiólogo y/o enfermería y/o técnico) estará en la zona de control observándole.

7. Contrastes

En RM del antebrazo suele ser necesario administrar contraste intravenoso.

El radiólogo valorará si considera indicado administrar contraste para ver mejor la zona que se está estudiando.

El personal de enfermería le preguntará sobre antecedentes de alergia, enfermedad renal, o si está tomando alguna medicación, etc.,

No se suele notar nada al administrar el contraste. Es infrecuente que note molestia en la zona del pinchazo. Si le ocurre eso AVISE. Será atendido por el personal sanitario.

Los contrastes de gadolinio son muy seguros.

Infrecuentemente se pueden producir reacciones adversas: prurito (picazón) enrojecimiento de la piel, náuseas, vómitos, ronquera, dificultad respiratoria....si nota alguna de estas cosas AVISE. Será atendido por el personal sanitario.

8. Otras medicaciones

En la RM del antebrazo no es necesario administrar otros medicamentos.

9. Claustrofobia o ansiedad ante la RM

Si tiene claustrofobia o ansiedad ante la realización de la RM informe a su médico de cabecera para que valore la conveniencia de prescribirle algún tratamiento que le permita estar más tranquilo durante la exploración.

Mejor que acuda acompañado por otra persona que pueda permanecer a su lado durante la exploración.

10. Embarazo

No se conocen efectos nocivos de la RM sobre el feto.

Sin embargo, se recomienda que no se realice RM, excepto si es imprescindible y no puede demorarse hasta después del parto.

Los radiólogos evaluarán la indicación de la RM de forma individualizada considerando riesgo/beneficios de su realización.

11. Lactancia

La realización de una RM no tiene consecuencias sobre la lactancia y no hay que interrumpirla.

Si se administra contraste de gadolinio a la madre debe evitarse la lactancia durante las siguientes 24 horas

12. Quién interpreta la exploración de RM

Los radiólogos, médicos especialista en radiodiagnóstico, valorarán la indicación de la prueba, supervisará la realización, analizarán las imágenes obtenidas y elaborarán un informe de la RM que quedará en la historia electrónica del SERGAS, a disposición de sus médicos de primaria o de especialidad.